



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области**
(Управление Роспотребнадзора по
Оренбургской области)

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021

Тел.: (3532) 33-37-98, Факс: 33-14-14

E-Mail: oren-rpn@esoo.ru, сайт:

56.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718

ИНН/КПП 5610086110/561001001

Главам муниципальных образований

№ _____
На № _____ от _____

О проведении мероприятий по
профилактике ГЛПС в осенний
период 2026 года

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области (далее – Управление) информирует о рисках осложнения эпидемиологической ситуации по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (далее – ГЛПС) населения области осенью 2026 года.

За 8 месяцев 2026 года в Оренбургской области показатель заболеваемости ГЛПС превысил среднемноголетний уровень в 1,3 раза. Заболеваемость зарегистрирована в 3 городах (Бугуруслан, Бузулук, Оренбург), 2 муниципальных округах (Абдулинский, Сорочинский) и 14 районах (Асекеевский, Беляевский, Бугурусланский, Бузулукский, Грачевский, Илекский, Курманаевский, Новосергиевский, Пономаревский, Оренбургский, Ташлинский, Тоцкий, Тюльганский, Шарлыкский).

Максимальные показатели заболеваемости с превышением среднеобластного в 2 и более раза зарегистрированы в г. Бугуруслане, Бузулуке, Асекеевском, Бугурусланском, Бузулукском, Беляевском, Грачевском, Илекском, Курманаевском, Пономаревском, Ташлинском, Тоцком, Тюльганском и Шарлыкском районах.

Согласно предварительному прогнозу, подготовленному ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», по результатам зоологического обследования природных очагов ГЛПС, ожидается рост случаев заболевания в период массовой миграции грызунов в населенные пункты, жилые и общественные здания в октябре-декабре текущего года, особенно в населенных пунктах, близко расположенных к пойменным лесам.

Мероприятия по борьбе с грызунами являются наиболее эффективными мерами, направленными на снижение заболеваемости ГЛПС.

Оптимальными сроками проведения барьерной дератизации следует считать период с 01.10.2026 до 13.11.2026 в связи с положительными температурными

значениями, сохраняющимися в этот период. После 13.11.2026 погодные условия будут способствовать массовой миграции грызунов в жилые постройки и дератизационные работы, проведенные позже, будут считаться неэффективными.

В соответствии СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» органы исполнительной власти муниципальных образований обеспечивают организацию и проведение дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, оздоровительных учреждений (в том числе баз отдыха), сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха и пребывания населения.

На основании изложенного и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения области по ГЛПС предлагаю:

1. Организовать в срок до 13.11.2026 проведение дератизационных мероприятий на территории населенных пунктов и за их пределами, в том числе на площадках накопления твердых бытовых отходов.

2. Обеспечить проведение активного информирования граждан по вопросам профилактики ГЛПС с использованием всех доступных методов (средства массовой информации, сайты муниципальных образований, памятки, листовки, сходы и т.д.), памятки прилагаются.

О принятых мерах проинформировать Управление до 16.11.2026.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Руководитель

М.С. Миронова



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

ПРОФИЛАКТИКА ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ (ГЛПС)



В туристических походах
следует избегать ночевки
в стогах сена и соломы

Если вас не было в доме или
на даче даже одну неделю,
необходимо в первую очередь
проветрить помещение. После
этого рекомендуется сделать
влажную уборку



При уборке дачных и подсобных
помещений рекомендуется
надевать ватно-марлевую повязку
из 4-х слоев марли и резиновые
перчатки, халат или другую
рабочую одежду



Нужно своевременно
вывозить бытовой мусор

Исключить возможность
проникновения грызунов в жилые
помещения и хозяйственные
постройки



Вода для питья должна быть
кипяченой. Пищевые продукты
следует хранить в недоступных
для грызунов местах

Подробнее на www.rosпотребnadzor.ru

ОСТОРОЖНО МЫШИ!

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (далее – ГЛПС) или народное название «мышинная лихорадка» – тяжелое острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами, характеризующееся лихорадкой, высокой интоксикацией, поражением почек и кровеносных сосудов.

Человек может заразиться при непосредственном соприкосновении с предметами и продуктами, загрязненными выделениями мышевидных грызунов, а также при вдыхании пыли, содержащей продукты жизнедеятельности больных зверьков.

Источником заражения людей вирусом ГЛПС являются мышевидные грызуны – основные хозяева вируса в природе.

Заражение человека также может происходить:

- при посещении леса (охота, рыбалка, сбор грибов, ягод);
- во время сельскохозяйственных работ, связанных с пылеобразованием;
- во время работ на дачных участках (наиболее часто во время уборки дачных домиков весной и осенью);
- в быту при уходе за скотом и уборке сараев, гаражей;
- по месту работы при наличии грызунов и следов их пребывания.

Со времени заражения до появления первых признаков заболевания происходит в среднем **от 14 до 20 дней**. Максимальный период может составлять 1,5 месяца.

Болезнь, как правило, начинается остро, бурно с резкого повышения температуры до 38-40°, беспокоит головная боль, озноб, тошнота, ломота во всем теле, чуть позже присоединяются боли в пояснице и животе, в отдельных случаях сопровождаются сыпью, кровоизлияниями в кожу и слизистые оболочки, кратковременным расстройством зрения.

ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ, НЕОБХОДИМО:

- проводить постоянную борьбу с грызунами в частных подворьях, на садово-огородных участках, других местах возможного скопления грызунов всеми известными методами (мышеловками, капканами, отравленными приманками);
- продукты питания ни в коем случае не оставлять на земле и в других местах, доступных для грызунов, хранить только в грызунонепроницаемой упаковке или в подвешенном состоянии;
- продукты питания испорченные грызунами или со следами их жизнедеятельности не употреблять в пищу;
- при проведении работ, связанных с пылеобразованием в природных условиях, в быту, в садах-огородах обязательно пользоваться средствами защиты органов дыхания (респираторами, ватно-марлевыми повязками), во время работ не курить, не принимать пищу, уборку проводить только влажным методом;

- при проведении работ в местах скопления грызунов пользоваться рукавицами, перчатками, после проведения работ тщательно мыть руки с мылом;
- проявлять осторожность при сборе хвороста, дров для разведения костров;
- при появлении любых из перечисленных симптомов заболевания в течение 1,5 мес. после посещения леса или после проведения работ, связанных с пылеобразованием, обратитесь за медицинской помощью и сообщите о фактах возможного контакта с мышевидными грызунами.

Надеемся, что следуя этим нетрудным советам, Вы не подвергнете себя риску заражения ГЛПС и будете здоровы.